

RODZICU, ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:



Sposób
wymowy
głosek
Twojego
dziecka



Pojawiające
się
niepłynności
w mowie



Prawidłowe
funkcjonowanie
słuchu



Prawidłowy
sposób
połykania

Sposób
oddychania
Twojego
dziecka



Sposób wymowy Twojego dziecka

Na każdym etapie rozwoju dziecka należy zwrócić uwagę czy prawidłowo wymawiane są głoski:
dźwięczne, np. z (sebra – zebra), w (fujek – wujek)
ciszące, syczące (ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz), głoska "l" z językiem za zębami, bez żadnych nieprzyjemnych dźwięków

Nieptytności mowy

Nieptytność w mowie objawia się przeciąganiem, powtarzaniem głosek lub sylab, np.: „popopodaj buuuuutkę”, „daaaj mimisia”. U dziecka do 5 roku życia może to być objaw nieptytności rozwojowej (może trwać do 6 miesięcy) i powinna sama ustąpić.

Prawidłowy słuch

Obserwuj czy dziecko reaguje na dźwięki otoczenia, słyszy nasze pytania/polecenia (czy wymaga powtórzeń), czy nie mówi zbyt głośno, a może często prosi o zwiększenie siły głosu w radiu lub telewizji. – warto szybko skonsultować to z lekarzem lub logopedą.

Sposób oddychania

Prawidłowy tor oddechowy umożliwia wydłużenie fazy wydechowej, czyli możliwość powiedzenia większej ilości słów na jednym wydechu. Obserwuj czy dziecko powietrze zaciąga nosem, a wypuszcza buzią oraz czy mówi na wydechu. Prawidłowy oddech to mniej infekcji, lepszy rozwój anatomiczny twarzy. Jeżeli widzisz, że dziecko ma otwartą buzię i jej nie domyka to odwiedź logopedę, który poszuka przyczyny takiej sytuacji, np. niskie napięcie mięśniowe warg, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka lub pokieruje do odpowiednich specjalistów, np. laryngologa.

Sposób połykania

Przyjrzyj się, czy dziecko nie ślini się zbyt mocno lub wsuwa język między zęby podczas picia – być może utrwalilo błędny nawyk połykania z językiem za dolnymi zębami. Ponadto niewłaściwe ułożenie języka w trakcie jedzenia, picia, przetykania śliny będzie wpływało na pojawianie się wad zgryzu. Opisany typ połykania często spotykany jest u dzieci, u których przedłużony jest czas stosowania smoczków, gdy w odpowiednim czasie nie wprowadzamy stałych pokarmów, gdy dziecko ma obniżone napięcie warg lub lubi trzymać w buzi kawałki ubrań, palce, zabawki.